

CPR 実施要領 2005ガイドラインに基づく

周囲の状況 二次災害なし患者側面に位置
(手)四肢の変形 大出血・嘔吐失禁
(手)呼びかけ 反応
(手)痛み刺激反応 乳児は足の裏で
意識ない場合直ちに救急車119番要請AED要請
口腔内異物確認 ある場合はハイムリックまたは背部叩打法
気道の確保 気道閉塞のないことを確認
呼吸確認 10秒以内に実施 呼吸なし 脈なし 確認
呼吸2回異物確認のため弱くゆっくり
循環のサイン 息(呼吸) 咳 うごき(体動)確認
人工呼吸2回 2秒呼吸3秒見る
心臓マッサージ30回 速度100回/分 4-5cm沈む程度
小児乳児 同様30:2 同速度 胸の厚み1/3が沈む程度
途中も 脈・呼吸の確認 循環のサイン 呼吸 咳 体動
医師・救急隊に引き継ぐまで止めない
AED実施 不要となれば心肺蘇生を続ける 2009/02 E Company

AED 操作上の注意事項

- 1 機器を持って来たらとにかく電源を入れる
- 2 音声ガイドに従いパッドを患者に向かって左胸上部鎖骨下と右脇肋骨外側下部分に貼る パットの絵を参考
- 3 パッドを貼る際、汗や湿気をふき取る。
- 4 心臓ペースメーカーなどの埋め込み医療器具を発見したら3センチ以上離す
- 5 肌に直に貼り、シブなどの上には貼らない
- 6 通電する際および心電図分析をする際は患者に触れない
- 7 8歳以上の者に小児用パッドは使用してはならない
- 8 1歳以上8歳未満の小児にのみ小児用パッドを使用する
やむをえない場合は小児に大人用パッドを使用しても構わない
1歳未満の乳児にAEDは使用しない
- 9 最初の電気ショックを1回行った後、直ちに胸骨圧迫を続ける(心臓マッサージ)
- 10 その後2分間のCPRを実施する
- 11 AEDによる心電図チェックが始まったら胸骨圧迫を中断
- 12 その後はAEDの音声メッセージに従い進める

CPR 実施要領 2005ガイドラインに基づく

周囲の状況 二次災害なし患者側面に位置
(手)四肢の変形 大出血・嘔吐失禁
(手)呼びかけ 反応
(手)痛み刺激反応 乳児は足の裏で
意識ない場合直ちに救急車119番要請AED要請
口腔内異物確認 ある場合はハイムリックまたは背部叩打法
気道の確保 気道閉塞のないことを確認
呼吸確認 10秒以内に実施 呼吸なし 脈なし 確認
呼吸2回異物確認のため弱くゆっくり
循環のサイン 息(呼吸) 咳 うごき(体動)確認
人工呼吸2回 2秒呼吸3秒見る
心臓マッサージ30回 速度100回/分 4-5cm沈む程度
小児乳児 同様30:2 同速度 胸の厚み1/3が沈む程度
途中も 脈・呼吸の確認 循環のサイン 呼吸 咳 体動
医師・救急隊に引き継ぐまで止めない
AED実施 不要となれば心肺蘇生を続ける 2009/02 E Company

AED 操作上の注意事項

- 1 機器を持って来たらとにかく電源を入れる
- 2 音声ガイドに従いパッドを患者に向かって左胸上部鎖骨下と右脇肋骨外側下部分に貼る パットの絵を参考
- 3 パッドを貼る際、汗や湿気をふき取る。
- 4 心臓ペースメーカーなどの埋め込み医療器具を発見したら3センチ以上離す
- 5 肌に直に貼り、シブなどの上には貼らない
- 6 通電する際および心電図分析をする際は患者に触れない
- 7 8歳以上の者に小児用パッドは使用してはならない
- 8 1歳以上8歳未満の小児にのみ小児用パッドを使用する
やむをえない場合は小児に大人用パッドを使用しても構わない
1歳未満の乳児にAEDは使用しない
- 9 最初の電気ショックを1回行った後、直ちに胸骨圧迫を続ける(心臓マッサージ)
- 10 その後2分間のCPRを実施する
- 11 AEDによる心電図チェックが始まったら胸骨圧迫を中断
- 12 その後はAEDの音声メッセージに従い進める

CPR 実施要領 2005ガイドラインに基づく

周囲の状況 二次災害なし患者側面に位置
(手)四肢の変形 大出血・嘔吐失禁
(手)呼びかけ 反応
(手)痛み刺激反応 乳児は足の裏で
意識ない場合直ちに救急車119番要請AED要請
口腔内異物確認 ある場合はハイムリックまたは背部叩打法
気道の確保 気道閉塞のないことを確認
呼吸確認 10秒以内に実施 呼吸なし 脈なし 確認
呼吸2回異物確認のため弱くゆっくり
循環のサイン 息(呼吸) 咳 うごき(体動)確認
人工呼吸2回 2秒呼吸3秒見る
心臓マッサージ30回 速度100回/分 4-5cm沈む程度
小児乳児 同様30:2 同速度 胸の厚み1/3が沈む程度
途中も 脈・呼吸の確認 循環のサイン 呼吸 咳 体動
医師・救急隊に引き継ぐまで止めない
AED実施 不要となれば心肺蘇生を続ける 2009/02 E Company

AED 操作上の注意事項

- 1 機器を持って来たらとにかく電源を入れる
- 2 音声ガイドに従いパッドを患者に向かって左胸上部鎖骨下と右脇肋骨外側下部分に貼る パットの絵を参考
- 3 パッドを貼る際、汗や湿気をふき取る。
- 4 心臓ペースメーカーなどの埋め込み医療器具を発見したら3センチ以上離す
- 5 肌に直に貼り、シブなどの上には貼らない
- 6 通電する際および心電図分析をする際は患者に触れない
- 7 8歳以上の者に小児用パッドは使用してはならない
- 8 1歳以上8歳未満の小児にのみ小児用パッドを使用する
やむをえない場合は小児に大人用パッドを使用しても構わない
1歳未満の乳児にAEDは使用しない
- 9 最初の電気ショックを1回行った後、直ちに胸骨圧迫を続ける(心臓マッサージ)
- 10 その後2分間のCPRを実施する
- 11 AEDによる心電図チェックが始まったら胸骨圧迫を中断
- 12 その後はAEDの音声メッセージに従い進める

CPR 実施要領 2005ガイドラインに基づく

周囲の状況 二次災害なし患者側面に位置
(手)四肢の変形 大出血・嘔吐失禁
(手)呼びかけ 反応
(手)痛み刺激反応 乳児は足の裏で
意識ない場合直ちに救急車119番要請AED要請
口腔内異物確認 ある場合はハイムリックまたは背部叩打法
気道の確保 気道閉塞のないことを確認
呼吸確認 10秒以内に実施 呼吸なし 脈なし 確認
呼吸2回異物確認のため弱くゆっくり
循環のサイン 息(呼吸) 咳 うごき(体動)確認
人工呼吸2回 2秒呼吸3秒見る
心臓マッサージ30回 速度100回/分 4-5cm沈む程度
小児乳児 同様30:2 同速度 胸の厚み1/3が沈む程度
途中も 脈・呼吸の確認 循環のサイン 呼吸 咳 体動
医師・救急隊に引き継ぐまで止めない
AED実施 不要となれば心肺蘇生を続ける 2009/02 E Company

AED 操作上の注意事項

- 1 機器を持って来たらとにかく電源を入れる
- 2 音声ガイドに従いパッドを患者に向かって左胸上部鎖骨下と右脇肋骨外側下部分に貼る パットの絵を参考
- 3 パッドを貼る際、汗や湿気をふき取る。
- 4 心臓ペースメーカーなどの埋め込み医療器具を発見したら3センチ以上離す
- 5 肌に直に貼り、シブなどの上には貼らない
- 6 通電する際および心電図分析をする際は患者に触れない
- 7 8歳以上の者に小児用パッドは使用してはならない
- 8 1歳以上8歳未満の小児にのみ小児用パッドを使用する
やむをえない場合は小児に大人用パッドを使用しても構わない
1歳未満の乳児にAEDは使用しない
- 9 最初の電気ショックを1回行った後、直ちに胸骨圧迫を続ける(心臓マッサージ)
- 10 その後2分間のCPRを実施する
- 11 AEDによる心電図チェックが始まったら胸骨圧迫を中断
- 12 その後はAEDの音声メッセージに従い進める

CPR 実施要領 2005ガイドラインに基づく

周囲の状況 二次災害なし患者側面に位置
(手)四肢の変形 大出血・嘔吐失禁
(手)呼びかけ 反応
(手)痛み刺激反応 乳児は足の裏で
意識ない場合直ちに救急車119番要請AED要請
口腔内異物確認 ある場合はハイムリックまたは背部叩打法
気道の確保 気道閉塞のないことを確認
呼吸確認 10秒以内に実施 呼吸なし 脈なし 確認
呼吸2回異物確認のため弱くゆっくり
循環のサイン 息(呼吸) 咳 うごき(体動)確認
人工呼吸2回 2秒呼吸3秒見る
心臓マッサージ30回 速度100回/分 4-5cm沈む程度
小児乳児 同様30:2 同速度 胸の厚み1/3が沈む程度
途中も 脈・呼吸の確認 循環のサイン 呼吸 咳 体動
医師・救急隊に引き継ぐまで止めない
AED実施 不要となれば心肺蘇生を続ける 2009/02 E Company

AED 操作上の注意事項

- 1 機器を持って来たらとにかく電源を入れる
- 2 音声ガイドに従いパッドを患者に向かって左胸上部鎖骨下と右脇肋骨外側下部分に貼る パットの絵を参考
- 3 パッドを貼る際、汗や湿気をふき取る。
- 4 心臓ペースメーカーなどの埋め込み医療器具を発見したら3センチ以上離す
- 5 肌に直に貼り、シブなどの上には貼らない
- 6 通電する際および心電図分析をする際は患者に触れない
- 7 8歳以上の者に小児用パッドは使用してはならない
- 8 1歳以上8歳未満の小児にのみ小児用パッドを使用する
やむをえない場合は小児に大人用パッドを使用しても構わない
1歳未満の乳児にAEDは使用しない
- 9 最初の電気ショックを1回行った後、直ちに胸骨圧迫を続ける(心臓マッサージ)
- 10 その後2分間のCPRを実施する
- 11 AEDによる心電図チェックが始まったら胸骨圧迫を中断
- 12 その後はAEDの音声メッセージに従い進める